

2.1.1 Sobrevida ante Infarto y Ataque Cardiovascular

Resultado Esperado

Indicador:

Porcentaje de personas de 45 años y más que conocen los síntomas de infarto agudo al miocardio (IAM).

Resultado esperado:

Mejorar la oportunidad de la atención de las personas con enfermedades cardiovasculares.

Frecuencia:

Según encuesta.

Unidad:

Personas

Polaridad:

Valores mayores son mejores.

Fuente:

Encuesta acerca de síntomas de infarto agudo al miocardio y ataque cerebral (numerador y denominador).

Responsable recolección de datos:

Departamento de Enfermedades No Transmisibles, DIPRECE.

Numerador:

Número de personas encuestadas de 45 años y más, que conocen los síntomas de IAM.

Denominador:

Número total de personas encuestadas de 45 años y más.

Línea de base (2010):

12,4%.

Meta (2020):

25%.

Desagregación:

Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.

Unidad responsable:

Departamento de Enfermedades No Transmisibles, DIPRECE.

Justificación:

Es importante mejorar las capacidades de los distintos actores involucrados en la identificación de los síntomas del infarto agudo al miocardio para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

Método:

El número de personas encuestadas de 45 años y más, que conocen los síntomas de IAM es dividido por el número total de personas encuestadas de 45 años y más, y posteriormente multiplicado por 100.