

## 2.1.8 Sobrevida ante Infarto y Ataque Cardiovascular

## Resultado Esperado

**Indicador:**

*Porcentaje de rehospitalización de pacientes con infarto agudo al miocardio (IAM) en un período de 3 meses.*

**Resultado esperado:**

*Mejorar la continuidad de la atención de las personas con enfermedades cardiovasculares.*

**Frecuencia:**

*Anual*

**Unidad:**

*Personas*

**Polaridad:**

*Valores menores son mejores.*

**Fuente:**

*Registro de egresos hospitalarios (numerador y denominador).*

**Responsable recolección de datos:**

*Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DIPLAS.*

**Numerador:**

*Número de pacientes que, tras un episodio de hospitalización por IAM, vuelven a reingresar antes de los 3 meses.*

**Denominador:**

*Número total de egresos hospitalarios por IAM.*

**Línea de base (2010):**

*10,6%.*

**Meta (2020):**

*8,48%.*

**Desagregación:**

*Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.*

**Unidad responsable:**

*Departamento de Enfermedades No Transmisibles, DIPRECE.*

**Justificación:**

*La tasa de mortalidad por Infarto Agudo al Miocardio (IAM) corresponde al principal diagnóstico dentro del grupo de las enfermedades isquémicas del corazón. En cuanto a la hospitalización, se observa una tendencia creciente en la tasa bruta de egresos por IAM en el período 2001 y 2007, de 39,1 y 48,0 por 100.000 habitantes, respectivamente. Las tasas son mayores a medida que aumenta la edad y son significativamente más altas en los hombres que en las mujeres en todos los rangos etarios.*

**Método:**

*El número de pacientes que, tras un episodio de hospitalización por IAM, vuelven a reingresar*



**FICHAS TECNICAS INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS SANITARIOS 2011-2020**

Departamento de Estrategia Nacional de Salud

División de Planificación Sanitaria

Ministerio de Salud

*antes de los 3 meses es dividido por el número total de egresos hospitalarios por IAM, y posteriormente multiplicado por 100.*