

2.1.9 Sobrevida ante Infarto y Ataque Cardiovascular

Resultado Esperado

Indicador:

Porcentaje de personas en tratamiento por hipertensión que se encuentran normotensas.

Resultado esperado:

Incrementar cobertura efectiva de HTA.

Frecuencia:

Según encuesta ENS.

Unidad:

Personas

Polaridad:

Valores mayores son mejores.

Fuente:

Encuesta nacional de salud (numerador y denominador).

Responsable recolección de datos:

Departamento de Epidemiología, DIPLAS.

Numerador:

Número de personas en tratamiento por HTA, que se encuentran normotensas (< 140/90).

Denominador:

Número total de personas con HTA.

Línea de base (2009):

16,8%.

Meta (2020):

32%.

Desagregación:

Según sexo, edad, región, servicio de salud y nivel educacional.

Unidad responsable:

Departamento de Enfermedades No Transmisibles, DIPRECE.

Justificación:

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, es el principal factor de mortalidad prematura. Se estima que la reducción de la presión arterial disminuiría el riesgo de infarto agudo al miocardio en un 20-25% y de ataque cerebrovascular en 35-51%.

El aumento de la cobertura efectiva se puede conseguir aumentando el número de personas que reciben tratamiento, o aumentando su efectividad. El aumento de la efectividad del tratamiento se puede conseguir aumentando la eficacia de las intervenciones, mejorando la adherencia, o mejorando el cumplimiento de protocolos de manejo clínico. La meta propuesta para 2020, corresponde a un incremento en un 50% de lo observado en 2010.

Método:

Se debe utilizar la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009-2010. Se trabajó con la muestra expandida ("factor_ex").

- 1. Identificar los individuos con HTA. La definición operacional correspondió a "promedio de tres mediciones mayores a 140 mm de Hg (sistólica) o mayores a 90 mm de Hg (diastólica), o normotenso, pero en tratamiento farmacológico".*

El número de individuos identificados corresponde al denominador de la cobertura efectiva (personas con necesidad). Las variables utilizadas fueron: "m2p8a: 1ra. Toma Sistólica"; "m2p8b. 1ra. Toma Diastólica", y las otras dos tomas; y h6: "¿Qué tipo de tratamiento está llevando?"; (respuestas de h6: "Medicamentos" (1); "Ambos" (3)).

- 2. Luego, del total de individuos que cumplieran la definición de se identificaron las personas normotensas.*

Estas últimas corresponden al numerador de la cobertura efectiva.