

2.2.1 Mortalidad por Cáncer

Resultado Esperado

Indicador:

Porcentaje de mujeres entre 25 y 64 años, que cuentan con prueba de Papanicolau (PAP) realizada dentro de los últimos 3 años.

Resultado esperado:

Mejorar la detección precoz del cáncer en grupos de riesgo.

Frecuencia:

*Según encuesta
CASEN.*

Unidad:

Personas

Polaridad:

Valores mayores son mejores.

Fuente:

Encuesta de caracterización socioeconómica nacional (numerador y denominador).

Responsable recolección de datos:

Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO).

Numerador:

Número de mujeres entre 25 y 64 años que cuentan con PAP en los últimos 3 años.

Denominador:

Población nacional de mujeres entre 25 y 64 años.

Línea de base (2011):

71,5%.

Meta (2020):

80%.

Desagregación:

Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.

Unidad responsable:

Departamento de Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores, DIPRECE.

Justificación:

Lograr la cobertura con PAP vigente, es una estrategia que cuenta con clara evidencia para reducir la morbimortalidad por cáncer cervicouterino.

Método:

El número de mujeres entre 25 y 64 años que cuentan con PAP en los últimos 3 años es dividido por el número total de mujeres entre 25 y 64 años de edad, y posteriormente multiplicado por 100.