

1.2 Muerte por Infecciones Respiratorias Agudas

Objetivo de Impacto

Indicador:

Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas (IRAs).

Objetivo:

Reducir la tasa de mortalidad por IRAs.

Frecuencia:

Anual

Unidad:

Personas

Polaridad:

Valores menores son mejores.

Fuente:

Registro nacional de defunciones (numerador) y proyecciones de población (denominador).

Responsable recolección de datos:

Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DIPLAS (numerador) e Instituto Nacional de Estadísticas (denominador).

Numerador:

Número anual de defunciones por IRAs.

Denominador:

Total de la población.

Línea de base (2010):

18,6 por 100.000 habitantes.

Meta (2020):

10,2 por 100.000 habitantes.

Desagregación:

Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.

Unidad responsable:

Departamento de Enfermedades Transmisibles, DIPRECE.

Justificación:

La mortalidad por IRAs se encuentra en disminución. La meta propuesta es mantener la tendencia observada.

Método:

El número anual de muertes por IRAs (códigos CIE 10: J00-J06; J10-J18; J20-J22 y H65-H66) es estratificado por sexo y tramos de edad (0 a 4, 5 a 14, 15 a 34, 35 a 44, 45 a 49, 50 a 79 y 80 y más). Cada número de casos es dividido por la población del estrato correspondiente, usando



FICHAS TECNICAS INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS SANITARIOS 2011-2020

Departamento de Estrategia Nacional de Salud

División de Planificación Sanitaria

Ministerio de Salud

población proyectada INE. Calculada las tasas específicas para cada tramo de edad y sexo, son estandarizadas usando la población del censo 2002.