

1.2.2 Muerte por Infecciones Respiratorias Agudas

Resultado Esperado

Indicador:

Porcentaje de personas adultas mayores (65 años y más) que reciben vacunación anti-neumocócica.

Resultado esperado:

Mejorar la cobertura de inmunización anti-neumococo en grupos prioritarios.

Frecuencia:

Anual

Unidad:

Personas

Polaridad:

A mayor porcentaje, mejor.

Fuente:

Registro nacional de inmunizaciones (numerador) y proyecciones de población INE (denominador).

Responsable recolección de datos:

Departamento de Inmunizaciones, DIPRECE (numerador) e Instituto Nacional de Estadísticas (denominador).

Numerador:

Número anual de personas adultas mayores que reciben vacunación anti-neumocócica.

Denominador:

Población total de adultos mayores.

Línea de base (2012):

60,4%.

Meta (2020):

≥95%.

Desagregación:

Según sexo, región, servicio de salud, urbano/rural y NEDU.

Unidad responsable:

Departamento de Inmunizaciones, DIPRECE.

Justificación:

El grupo de personas adultas mayores (65 años y más) exhiben un elevado riesgo a presentar la enfermedad en relación con el resto de la población. La inmunización entrega protección a este grupo.

Método:



FICHAS TECNICAS INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS SANITARIOS 2011-2020

Departamento de Estrategia Nacional de Salud

División de Planificación Sanitaria

Ministerio de Salud

El número anual de personas adultas mayores que reciben vacunación anti-neumocócica es dividido por la población total de adultos mayores, y posteriormente se multiplica por 100.