

1.2.3 Muerte por Infecciones Respiratorias Agudas

Resultado Esperado

Indicador:

Porcentaje de niños(as) de 1 año con esquema completo de vacunación anti-neumocócica.

Objetivo:

Mejorar la cobertura de inmunización anti-neumococo en grupos prioritarios.

Frecuencia:

Anual

Unidad:

Personas

Polaridad:

A mayor porcentaje, mejor.

Fuente:

Registro nacional de inmunizaciones (numerador) y proyecciones de población INE (denominador).

Responsable recolección de datos:

Departamento de Inmunizaciones, DIPRECE (numerador) e Instituto Nacional de Estadísticas (denominador).

Numerador:

Número anual de niños(as) de 1 año que reciben esquema completo de vacunación anti-neumocócica.

Denominador:

Población total de niños(as) de 1 año.

Línea de base (2013):

90,9%.

Meta (2020):

≥95%.

Desagregación:

Según sexo, región, servicio de salud, urbano/rural y NEDU.

Unidad responsable:

Departamento de Inmunizaciones, DIPRECE.

Justificación:

La inmunización anti-neumococo se fundamenta por la carga de enfermedad asociada y por la seguridad y eficacia de la vacuna en este grupo de edad, además de tener un efecto indirecto sobre la morbilidad en población adulta.



FICHAS TECNICAS INDICADORES PARA LOS OBJETIVOS SANITARIOS 2011-2020

Departamento de Estrategia Nacional de Salud

División de Planificación Sanitaria

Ministerio de Salud

Método:

El número anual de niños(as) de 1 año que reciben vacunación anti-neumocócica es dividido por la población total de niños(as) de 1 año, y posteriormente se multiplica por 100.