

3.4.3 Obesidad Infantil

Resultado Esperado

Indicador:

Prevalencia de malnutrición por exceso en niños y niñas bajo control entre los 12 y 24 meses de edad.

Resultado esperado:

Disminuir la prevalencia de factores de riesgo de obesidad infantil en población menor de 6 años.

Frecuencia:

Anual

Unidad:

Personas

Polaridad:

Valores menores son mejores.

Fuente:

Resúmenes estadísticos mensuales (numerador y denominador).

Responsable recolección de datos:

Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DIPLAS.

Numerador:

Número de niños y niñas entre 12 y 24 meses de edad bajo control que presentan malnutrición por exceso.

Denominador:

Número de niños y niñas entre 12 y 24 meses de edad bajo control.

Línea de base (2010):

34,1%.

Meta (2020):

33,1%.

Desagregación:

Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.

Unidad responsable:

*Departamento de Alimentos y Nutrición, DIPOL.
División de Atención Primaria.*

Justificación:

Existe evidencia que indica que la consejería intensiva sobre dieta, actividad física o ambas, junto con intervenciones dirigidas a desarrollar habilidades, motivación y estrategias de apoyo, producen una baja de peso modesta, 3 a 5 kilos al año, pero mantenida en el tiempo en adultos con obesidad.

Método:

El número anual de niños y niñas entre 12 y 24 meses de edad que presentan malnutrición por exceso es dividido por el número total de niños y niñas entre 12 y 24 meses de edad bajo control, y posteriormente multiplicado por 100.

Numerador y denominador: REM P2 Sección A.