

## 4.1.3 Salud Perinatal

## Resultado Esperado

**Indicador:**

*Porcentaje de gestantes bajo control entre las 35 y 37 semanas con estudio de Estreptococo B.*

**Resultado esperado:**

*Categorización de riesgo en gestantes que se controlan en centros de atención primaria de salud (APS).*

**Frecuencia:**

*Anual*

**Unidad:**

*Personas*

**Polaridad:**

*Mayores valores son mejores.*

**Fuente:**

*Resúmenes estadísticos mensuales (numerador y denominador).*

**Responsable recolección de datos:**

*Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DIPLAS.*

**Numerador:**

*Número de gestantes bajo control entre las 35 y 37 semanas con estudio de Estreptococo B.*

**Denominador:**

*Número de gestantes bajo control entre las 35 y 37 semanas.*

**Línea de base (2010):**

*0%.*

**Meta (2020):**

*100%.*

**Desagregación:**

*Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y NEDU.*

**Unidad responsable:**

*Departamento de Ciclo Vital, DIPRECE.*

**Justificación:**

*La transmisión del estreptococo del grupo B se produce desde la madre (20-30% de todas las mujeres embarazadas) al hijo por vía transplacentaria o principalmente durante el trabajo de parto. Aproximadamente el 50% de los recién nacidos de las madres colonizadas serán a su vez colonizadas durante el parto y el 2% de estos desarrollara una enfermedad invasiva.*

**Método:**

*El número anual de gestantes bajo control entre las 35 y 37 semanas con estudio de Estreptococo B es dividido por el número total de gestantes bajo control entre las 35 y 37 semanas, y posteriormente se multiplica por 100.*

*Numerador: REM P1*

*Denominador: REM*