

## 1.1.1 Tuberculosis

## Resultado Esperado

**Indicador:**

*Porcentaje de recién nacidos vivos que reciben vacuna bacilo de Calmette-Guérin (BCG).*

**Resultado esperado:**

*Mejorar coberturas de vacunación con BCG en recién nacidos.*

**Frecuencia:**

*Anual*

**Unidad:**

*Personas*

**Polaridad:**

*A mayor cobertura, mejor.*

**Fuente:**

*Registro nacional de inmunizaciones (numerador) y base de datos de nacimientos (denominador).*

**Responsable recolección de datos:**

*Departamento de Inmunizaciones, DIPRECE (numerador) y Departamento de Estadísticas e Información en Salud, DIPLAS (denominador).*

**Numerador:**

*Número de recién nacidos vacunados con BCG.*

**Denominador:**

*Número total de recién nacidos vivos inscritos.*

**Línea de base (2010):**

*96,9%.*

**Meta (2020):**

*≥95%.*

**Desagregación:**

*Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y NEDU.*

**Unidad responsable:**

*Departamento de Inmunizaciones, DIPRECE.*

**Justificación:**

*La vacunación con BCG de los recién nacidos permite reducir la mortalidad por tuberculosis en los menores de edad debido a la protección a formas diseminadas y a meningitis tuberculosa.*

**Método:**

*El número anual de recién nacidos vacunados con BCG es dividido por el número total de recién nacidos vivos inscritos, y posteriormente se multiplica por 100.*