

## 1.5.2 Muertes por VIH/SIDA

## Resultado Esperado

**Indicador:**

*Porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) que declara haberse realizado el examen para detección de VIH alguna vez en la vida.*

**Resultado esperado:**

*Aumentar la detección e ingreso precoz a tratamiento con priorización en grupos vulnerables.*

**Frecuencia:**

*Anual*

**Unidad:**

*Personas*

**Polaridad:**

*Valores mayores son mejores.*

**Fuente:**

*Estudio socio-comportamental de HSH (numerador y denominador).*

**Responsable recolección de datos:**

*Departamento Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, DIPRECE*

**Numerador:**

*Número de HSH que declara haberse realizado el examen para detección de VIH alguna vez en la vida.*

**Denominador:**

*Número total de HSH.*

**Línea de base (2010):**

*59,4%.*

**Meta (2020):**

*65%.*

**Desagregación:**

*Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.*

**Unidad responsable:**

*Departamento Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, DIPRECE.*

**Justificación:**

*Intervenciones focalizadas permiten mejorar los aspectos de diagnóstico oportuno, derivación al control y tratamiento, así como su adherencia relacionados a la enfermedad, contribuyendo a la obtención de los objetivos terapéuticos deseados.*

**Método:**

*El número de HSH que declara haberse realizado el examen para detección de VIH alguna vez en la vida es dividido por el número total de HSH, y posteriormente multiplicado por 100.*