

## 1.5.3 Muertes por VIH/SIDA

## Resultado Esperado

**Indicador:**

*Sobrevida a tres años de personas que inician terapia antirretroviral (TARV).*

**Resultado esperado:**

*Mejorar la adherencia a control y tratamiento de personas que viven con VIH/SIDA.*

**Frecuencia:**

*Anual*

**Unidad:**

*Personas*

**Polaridad:**

*Valores mayores son mejores.*

**Fuente:**

*Registro de evaluación de impacto de TARV (numerador y denominador).*

**Responsable recolección de datos:**

*Departamento Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, DIPRECE.*

**Numerador:**

*Número de personas que siguen con vida y en TARV a los 36 meses de iniciada la terapia.*

**Denominador:**

*Número total de personas que iniciaron TARV y completaron 36 meses de seguimiento (incluye los que fallecieron, suspendieron tratamiento o se perdieron del seguimiento).*

**Línea de base (2010):**

*93,4%.*

**Meta (2020):**

*97%.*

**Desagregación:**

*Según sexo, edad, región, servicio de salud, urbano/rural y nivel educacional.*

**Unidad responsable:**

*Departamento Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, DIPRECE.*

**Justificación:**

*La evidencia muestra que el diagnóstico y tratamiento precoz confieren claras ventajas para la sobrevida.*

**Método:**

*El número de personas que siguen con vida y en TARV a los 36 meses de iniciada la terapia es dividido por el número total de personas que iniciaron TARV y completaron 36 meses de seguimiento (incluye los que fallecieron, suspendieron tratamiento o se perdieron del seguimiento), y posteriormente multiplicado por 100.*